

Nederlands



Tyverb® 250 mg

filmomhulde tabletten
lapatinib

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Inhoud van deze bijsluiter

- Waarvoor wordt dit middel gebruikt?
- Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u extra voorzichtig mee zijn?
- Hoe gebruikt u dit middel?
- Mogelijke bijwerkingen
- Hoe bewaart u dit middel?
- Inhoud van de verpakking en overige informatie

1 Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Tyverb wordt gebruikt voor de behandeling van bepaalde vormen van borstkanker (*met overexpressie van HER2*) waarbij verspreiding van de originele tumor heeft plaatsgevonden (*gevoerdeerde of gemetastaseerde borstkanker*). Het kan ervoor zorgen dat kankercellen in hun groei worden afgeremd of dat hun groei gestopt wordt, of het kan kankercellen doden. Tyverb wordt voorgeschreven in combinatie met andere geneesmiddelen tegen kanker.

Tyverb wordt voorgeschreven in combinatie met capcitabine voor patiënten die al andere behandelingen hebben ondergaan voor hun **gevoerdeerde of gemetastaseerde borstkanker**.

Tyverb wordt voorgeschreven in combinatie met een aromataseremmer bij patiënten met hormongevoelige gemetastaseerde borstkanker (borstkanker waarbij hormonen het uitzaaien bevorderen) die tot nu toe niet in aanmerking komen voor chemotherapie.

Informatie over deze geneesmiddelen is beschikbaar in aparte patiëntbijsluiters. **Vraag uw arts om informatie over deze geneesmiddelen**.

2 Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

- U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Uw arts zal onderzoeken doen om na te gaan of uw hart goed werkt voordat u Tyverb gaat gebruiken en tijdens de behandeling.

→ Vertel uw arts als u hartproblemen heeft voordat u Tyverb gaat gebruiken.

Vertel uw arts voordat u Tyverb gaat gebruiken:

- als u leverproblemen heeft
- als u nierproblemen heeft

Uw arts zal ook uw bloed laten onderzoeken en uw leverfunctie controleren voor en tijdens de behandeling met Tyverb.

→ Vertel uw arts als een van de bovenstaande situaties op u van toepassing is.

Nederlands

Zelden voorkomende bijwerkingen

Deze kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 1.000 personen.

• ernstige allergische reacties (zie het begin van rubriek 4)

Als u andere bijwerkingen krijgt

- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat?
- Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Verminderen van het risico op diarree en huiduitslag

Tyverb kan ernstige diarree veroorzaken

Indien u diarree krijgt tijdens het gebruik van Tyverb, moet u:

- veel drinken (8 tot 10 glazen per dag), zoals water, sportdranken of andere heldere vloeistoffen
- voedsel eten met een laag vetgehalte en een hoog eiwitgehalte in plaats van vet of gekruid voedsel
- gekookte groenten eten in plaats van rauwe groente en fruit schillen voordat u het gaat eten
- melk en melkproducten (inclusief roomsijs) vermijden
- kruidensupplementen vermijden (sommige hiervan kunnen diarree veroorzaken)

→ Vertel u arts als uw diarree aanhoudt.

Tyverb kan huiduitslag veroorzaken

Uw arts zal uw huid controleren voor en gedurende de behandeling. Om een gevoelige huid te verzorgen kunt u:

- zich wassen met een zeeprijne reiniger
- gebruik maken van geurvrije, hypoallergene schoonheidsproducten
- zonnebrand gebruiken (beschermingsfactor [SPF] 30 of hoger)

→ Vertel uw arts als huiduitslag krijgt.

5 Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en de blister of fles. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren beneden 30°C.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u niet met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6 Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof in dit middel is lapatinib. Elk filmomhulde tablet bevat lapatinibdisitosylaatmonohydraat, overeenkomend met 250 mg lapatinib.

De andere stoffen in dit middel zijn: Microkristallijne cellulose, povidon (K30), natriumzetmeeglycolaat (Type A), magnesiumstearaat, hypromellose, titaniumdioxide (E171), macrogol 400, polysorbaat 80, geel ijzeroxide (E172), rood ijzeroxide (E172).

Hoe ziet Tyverb eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Tyverb filmomhulde tabletten zijn ovale, biconvexe, gele filmomhulde tabletten aan één zijde gemarkeerd met 'GS XIG'.

Tyverb is verkrijgbaar in blisterverpakkingen of flessen.

Blisterverpakkingen

Elke verpakking Tyverb bevat 70 of 84 tabletten in blisterverpakkingen met aluminiumfolie van 10 of 12 stuks. Elke blisterverpakking heeft een perforatie in het midden en kan worden gescheiden in twee blisters met 5 of 6 tabletten, afhankelijk van de verpakkingssrootte. Neem altijd het aantal tabletten dat uw arts u heeft voorgeschreven. Als u twijfelt, vraag het dan aan uw arts of apotheker.

Tyverb is ook verkrijgbaar in multiverpakkingen met 140 tabletten, die bestaan uit 2 verpakkingen; elke verpakking bevat 70 tabletten.

Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingssrootten in de handel worden gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning:

Glaxo Group Ltd, Greenford, Middlesex UB6 0NN, Verenigd Koninkrijk

Fabrikant:

Glaxo Wellcome S.A., Avenida de Extremadura 3, 09400 Aranda de Duero, Burgos, Spanje

7 Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en de blister of fles. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren beneden 30°C.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u niet met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Nederlands

1 Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruik u naast Tyverb nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort gelezen gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrijf kunt krijgen.

Het is belangrijk dat u uw arts vertelt als u een van de onderstaande geneesmiddelen gebruikt of kort gelezen heeft gebruikt. Sommige geneesmiddelen kunnen de manier waarop Tyverb werkt beïnvloeden of Tyverb kan de werking van die geneesmiddelen beïnvloeden.

Dese geneesmiddelen zijn middelen uit de volgende groepen:

- Sint-janskruid – een kruidenextract dat wordt gebruikt wordt om **depressie** te behandelen
- erythromycine, ketoconazole, itraconazole, posaconazole, voriconazole, rifabutine, rifampicine, telithromycine – geneesmiddelen die gebruikt worden bij **infecties**
- cyclosporine – een geneesmiddel dat gebruikt wordt om het immunsysteem te onderdrukken, bijvoorbeeld na organtransplantatie
- ritonavir, saquinavir – geneesmiddelen die gebruikt worden bij HIV (AIDS)
- fenytoïne, carbamazepine – geneesmiddelen die gebruikt worden bij **insulines**
- cisapride – een geneesmiddel dat gebruikt wordt bij **bepaalde maag-/darmproblemen**
- pimozide – een geneesmiddel dat gebruikt wordt bij **bepaalde psychische ziekten**
- quinidine, digoxine – geneesmiddelen die gebruikt worden bij **bepaalde hartproblemen**
- repaglinide – een geneesmiddel dat gebruikt wordt bij **diabetes**
- verapamil – een geneesmiddel dat gebruikt wordt bij **hoog bloeddruk of angina pectoris**
- nefazodone – een geneesmiddel dat gebruikt wordt bij **depressie**
- topotecan, paclitaxel, irinotecan, docetaxel – geneesmiddelen die gebruikt worden bij **bepaalde vormen van kanker**
- rosuvastatin – een geneesmiddel dat gebruikt wordt bij de behandeling van **hoog cholesterol**
- geneesmiddelen die de zuurgaard in de maag verlagen (gebruikt bij **maagzuur of indigestie**)
- Vertel uw arts als u een van deze middelen gebruikt of dat u kort gelezen heeft gebruikt.

Uw arts zal controleren welke geneesmiddelen u momenteel gebruikt om ervan verzekerd te zijn dat u geen geneesmiddelen gebruikt die niet in combinatie met Tyverb gebruikt mogen worden. Uw arts zal u adviseren of er een alternatief beschikbaar is.

2 Waarop moet u letten met eten en drinken?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Uw arts zal beslissen over de juiste dosering Tyverb, afhankelijk van het type borstkanker dat u heeft.

Indien u Tyverb in combinatie met **capcitabine** voorgeschreven heeft gekregen, is de gebruikselijke dosering **vijf tabletten Tyverb** eenmaal per dag.

Drink tijdens de behandeling met Tyverb geen grapefruitsap.

3 Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Uw arts zal beslissen over de juiste dosering Tyverb, afhankelijk van het type borstkanker dat u heeft.

Indien u Tyverb in combinatie met **capcitabine** voorgeschreven heeft gekregen, is de gebruikselijke dosering **zes tabletten Tyverb** eenmaal per dag.

Symptomen kunnen onder meer zijn:

- huiduitslag (waaronder jeukende uitslag met bulten)
- ongewoon piepende ademhaling of moeilijk ademhalen
- gezwellen oogleden, lippen of tong
- pijn in de spieren of gewrichten
- collaps of black-out

→ Vertel uw arts om **omdat Tyverb eenmaal per dag** te gebruiken.

4 Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Ernstige allergische reactie

Deze zelden voorkomende bijwerking kan voorkomen bij maximaal 1 op de 1.000 personen en kan zich snel ontwikkelen.

Symptomen kunnen onder meer zijn:

- huiduitslag (waaronder jeukende uitslag met bulten)
- ongewoon piepende ademhaling of moeilijk ademhalen
- gezwellen oogleden, lippen of tong
- pijn in de spieren of gewrichten
- collaps of black-out

→ Vertel uw arts om **omdat Tyverb eenmaal per dag** te gebruiken.

Andere vaak voorkomende bijwerkingen

Deze kunnen voorkomen bij meer dan 1 op de 10 personen.

• diarree (waardoor u kunt uitdrogen, wat kan leiden tot ernstige complicaties)

→ Vertel uw arts om **omdat Tyverb eenmaal per dag** te gebruiken.

Andere zeer vaak voorkomende bijwerkingen

Deze kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 100 personen.

• door de behandeling veroorzaakte longontsteking, die kortademigheid of hoesten kan veroorzaken

Neem direct contact op met uw arts, wanneer u een van deze symptomen krijgt.

Andere soms voorkomende bijwerkingen

Deze kunnen voorkomen bij meer dan 1 op de 1000 personen.

• door de behandeling veroorzaakte longontsteking, die kortademigheid of hoesten kan veroorzaken

Neem direct contact op met uw arts, wanneer u een van deze symptomen krijgt.

4 Possible side effects

Like all medicines, this medicine can cause side effects, although not everybody gets them.

Severe allergic reaction

This rare side effect may affect up to 1 in 1000 people and develop rapidly.

Symptoms may include:

- skin rash (including itchy, bumpy rash)
- unusual wheezing, or difficulty in breathing
- swollen eyelids, lips or tongue
- pains in muscles or joints
- collapse or black-out

→ Tell your doctor immediately if you get any of these symptoms. Don't take any more tablets.

English

Other very common side effects

- loss of appetite
- feeling sick (nausea)
- being sick (vomiting)
- tiredness, feeling weak
- indigestion
- constipation
- sore mouth/mouth ulcers
- stomach pain
- trouble sleeping
- back pain
- pain in hands and feet
- joint or back pain
- a skin reaction on the palms of the hands or soles of the feet (including tingling, numbness, pain, swelling or reddening)
- cough, shortness of breath
- headache

Uncommon side effects

These may affect up to 1 in 100 people:
 • treatment-induced lung inflammation, which may cause shortness of breath or cough
 → Tell your doctor immediately if you get either of these symptoms.

Other uncommon side effects include:

- blood tests results that show changes in liver function (usually mild and temporary)

Rare side effects

This may affect up to 1 in 1000 people:
 • severe allergic reactions (see the beginning of section 4)

If you get other side effects

- If you notice any side effects not listed in this leaflet:
 → Tell your doctor or pharmacist.

Reducing the risk of diarrhoea and skin rash

Tyverb can cause severe diarrhoea

If you suffer from diarrhoea while taking Tyverb:
 • drink plenty of fluids (8 to 10 glasses a day), such as water, sports drinks or other clear liquids

- eat low-fat, high protein foods instead of fatty or spicy foods
- eat cooked vegetables instead of raw vegetables and remove the skin from fruits before eating
- avoid milk and milk products (including ice cream)
- avoid herbal supplements (some may cause diarrhoea).

→ Tell your doctor if your diarrhoea continues.

Tyverb can cause skin rash

Your doctor will check your skin before and during treatment.
 To care for sensitive skin:

- wash with a soap-free cleanser
- use fragrance free, hypoallergenic beauty products
- use sunscreen (Sun Protection Factor [SPF] 30 or higher).

→ Tell your doctor if you get a skin rash.

- nose bleed
 - hot flush
 - unusual hair loss or thinning
- Tell your doctor if any of these side effects get severe or troublesome.

Common side effects

These may affect up to 1 in 10 people:

- an effect on how your heart works
 - In most cases, the effect on your heart will not have any symptoms. If you do experience symptoms associated with this side effect, these are likely to include an irregular heartbeat and shortness of breath.
 - liver problems, which may cause itchy, yellow eyes or skin (*jaundice*), or dark urine or pain or discomfort in the right upper area of the stomach.
- Tell your doctor if you get any of these symptoms.

Other common side effects

- nail disorders – such as a tender infection and swelling of the cuticles
- Tell your doctor or pharmacist if this side effect gets severe or troublesome.

5 How to store Tyverb

Keep this medicine out of the sight and reach of children.

Do not use this medicine after the expiry date which is stated on the blister or bottle or the carton.

Do not store above 30°C.

Do not throw away any medicines via wastewater or household waste. Ask your pharmacist how to throw away medicines you no longer use. These measures will help to protect the environment.

- liver problems, which may cause itchy, yellow eyes or skin (*jaundice*), or dark urine or pain or discomfort in the right upper area of the stomach.
- Tell your doctor if you get any of these symptoms.

Marketing Authorisation Holder

Glaxo Group Ltd, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN, United Kingdom.

Manufacturer

Glaxo Wellcome S.A., Avenida de Extremadura 3, 09400 Aranda de Duero, Burgos, Spain.

Deutsch

gsk GlaxoSmithKline

Tyverb® 250 mg

Filmtabletten
Lapatinib

6 Contents of the pack and other information

What Tyverb contains

The active substance in Tyverb is lapatinib. Each film-coated tablet contains lapatinib ditosylate monohydrate, equivalent to 250 mg lapatinib.

The other ingredients are:

Microcrystalline cellulose, povidone (K30), sodium starch glycolate (Type A), magnesium stearate, hypromellose, titanium dioxide (E171), macrogol 400, polysorbate 80, iron oxide yellow (E172), iron oxide red (E172).

Rare side effects

This may affect up to 1 in 1000 people:

• severe allergic reactions (see the beginning of section 4)

If you get other side effects

• If you notice any side effects not listed in this leaflet:

→ Tell your doctor or pharmacist.

Reducing the risk of diarrhoea and skin rash

Tyverb can cause severe diarrhoea

If you suffer from diarrhoea while taking Tyverb:
 • drink plenty of fluids (8 to 10 glasses a day), such as water, sports drinks or other clear liquids

- eat low-fat, high protein foods instead of fatty or spicy foods
- eat cooked vegetables instead of raw vegetables and remove the skin from fruits before eating
- avoid milk and milk products (including ice cream)
- avoid herbal supplements (some may cause diarrhoea).

→ Tell your doctor if your diarrhoea continues.

Tyverb can cause skin rash

Your doctor will check your skin before and during treatment.

To care for sensitive skin:

- wash with a soap-free cleanser
- use fragrance free, hypoallergenic beauty products
- use sunscreen (Sun Protection Factor [SPF] 30 or higher).

→ Tell your doctor if you get a skin rash.

5 How to store Tyverb

Keep this medicine out of the sight and reach of children.

Do not use this medicine after the expiry date which is stated on the blister or bottle or the carton.

Do not store above 30°C.

Do not throw away any medicines via wastewater or household waste. Ask your pharmacist how to throw away medicines you no longer use. These measures will help to protect the environment.

6 Inhalt der Packung und weitere Informationen

Seltene Nebenwirkungen

Diese können bis zu 1 Person von 1.000 betreffen:
 • Schwere allergische Reaktionen (siehe Anfang des Abschnitts 4)

Wenn bei Ihnen andere Nebenwirkungen auftreten
 Wenn Sie irgendwelche Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind:
 → Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Empfehlungen zur Verringerung des Risikos, Durchfall und Hautausschlag zu bekommen

Tyverb kann schwere Durchfälle verursachen

Wenn Sie an Durchfall leiden, während Sie Tyverb einnehmen:

- Trinken Sie viel Flüssigkeit (8 bis 10 Gläser am Tag) wie Wasser, Sportgetränke oder andere reine Flüssigkeiten.

• Nehmen Sie Nahrungsmittel mit niedrigem Fett- und hohem Proteingehalt anstelle von fettigen oder scharfen Speisen zu sich.

• Nehmen Sie gekochtes statt rohes Gemüse zu sich und schälen Sie die Haut von Früchten ab, bevor Sie diese verzehren.

• Vermeiden Sie Milch und Milchprodukte (einschließlich Eiskrem)

• Vermeiden Sie pflanzliche Beilagen (einige davon können Durchfall verursachen).

→ Informieren Sie Ihren Arzt, wenn der Durchfall weiterbesteht.

Tyverb kann Hautausschlag verursachen

Ihr Arzt wird Ihre Haut vor Beginn und während der Behandlung untersuchen.

Zur Pflege einer empfindlichen Haut:

• Waschen Sie sich mit einem seifenfreien Reinigungsmittel

• Verwenden Sie Duftstoff-freie, hypoallergene Schönheitsprodukte

• Verwenden Sie Sonnenschutzmittel (Lichtschutzfaktor [LSF] 30 oder höher)

→ Informieren Sie Ihren Arzt, wenn Sie eine Hautausschlag bekommen sollten.

Andere häufige Nebenwirkungen

Diese können mehr als 1 Person von 10 betreffen:

• Durchfall (der zu Verlust von Körperflüssigkeit und zu schwerwiegenden Folgeerscheinungen führen kann)

→ Informieren Sie Ihren Arzt, wenn Sie Durchfall bekommen. Weitere Empfehlungen zur Verringerung des Durchfallrisikos sind am Ende des Abschnitts 4 aufgeführt.

• Hautausschlag, trockene Haut, Juckreiz

→ Informieren Sie Ihren Arzt, wenn Sie einen Hautausschlag bekommen. Weitere Empfehlungen zur Verringerung des Hautausschlagrisikos sind am Ende des Abschnitts 4 aufgeführt.

Andere sehr häufige Nebenwirkungen:

• Appetitlosigkeit

• Übelkeit

• Erbrechen

• Müdigkeit, Schwächegefühl

• Verdauungsstörungen

• Verstopfung

Deutsch

1 Was ist Tyverb und wofür wird es angewendet?

Tyverb wird zur Behandlung bestimmter (HER2-Überexprimierende) Brustkrebsarten eingesetzt, die sich über den Ursprungstumor hinaus verbreitet haben (*fortgeschritten* oder *metastasiert* Brustkrebs). Es kann das Wachstum von Krebszellen verlangsamen oder zum Stillstand bringen, oder diese töten.

Tyverb wird zur Einnahme in Kombination mit einem anderen Arzneimittel gegen Krebs verschrieben.

Tyverb wird in **Kombination mit Capecitabin** bei Patienten verschrieben, die vorher bereits eine andere Behandlung ihres fortgeschrittenen oder metastasierten Brustkrebses hatten.

Tyverb wird in **Kombination mit einem Aromatase-Inhibitor** bei Patienten mit hormonabhängigem Brustkrebs (Brustkrebs, der mit einer höheren Wahrscheinlichkeit bei Anwesenheit von Hormonen wächst) verschrieben, die derzeit nicht für eine Chemotherapie vorgesehen sind.

Informationen zu diesen Arzneimitteln sind in gesonderten Gebrauchsinformationen beschrieben. Fragen Sie Ihren Arzt, um Informationen zu diesen anderen Arzneimitteln zu erhalten.

2 Was sollten Sie vor der Einnahme von Tyverb beachten?

Tyverb darf nicht eingenommen werden,

- wenn Sie allergisch gegen Lapatinib oder einen in Abschnitt 6 genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.

Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Tyverb ist erforderlich

Ihr Arzt wird Untersuchungen zur Überprüfung Ihrer Herzfunktion vor und während der Behandlung mit Tyverb durchführen.

→ Informieren Sie vor dem Beginn der Einnahme von Tyverb Ihren Arzt, wenn Sie irgendwelche Probleme mit den Herzen haben.

Bevor Sie Tyverb einnehmen, muss Ihr Arzt ferner wissen:

- wenn Sie an irgendwelchen Problemen mit der Leber leiden.
- wenn Sie an irgendwelchen Problemen mit den Nieren leiden.

Ihr Arzt wird Laboruntersuchungen durchführen, um zu überprüfen, ob Ihre Leber vor und während der Behandlung mit Tyverb normal arbeitet.

→ Informieren Sie Ihren Arzt, wenn eine dieser Bedingungen für Sie zutrifft.

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
 For any information about this medicinal product, please contact the local representative of the Marketing Authorisation Holder.

Falls Sie weitere Informationen über das Arzneimittel wünschen, setzen Sie sich bitte mit dem örtlichen Vertreter des pharmazeutischen Unternehmers in Verbindung.

België/België/Belgien

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.
 Tel./Tel.: + 32 (0)10 85 52 00

Die sonstigen Bestandteile sind:

Mikrokristalline Cellulose, Povidon (K30),

Carboxymethylstärke-Natrium (Typ A),

Magnesiumstearat, Hypromellose, Titandioxid (E171),

Macrogol 400, Polysorbit 80, Eisen(III)-hydroxid-oxid x H₂O (E172), Eisen(III)-oxid (E172).

Was Tyverb enthält

Der Wirkstoff in Tyverb ist Lapatinib. Jede Filmtablette enthält Lapatinib/ditosylat 1 H₂O, entsprechend 250 mg Lapatinib.

Was Tyverb aussieht und Inhalt der Packung

Tyverb Filmtabletten sind oval, beidseitig gewölbt, mit gelbem Film überzogen, auf einer Seite mit der Prägung "GS XIG" versehen.

Tyverb ist sowohl in Blisterpackungen als auch in Flaschen erhältlich:

Blisterpackungen

Jede Packung Tyverb enthält 70 oder 84 Tabletten in Aluminiumfol