

Gebrauchsinformation: Information für den Anwender**Condylox**

0,5 % Lösung
Podophyllotoxin

Zur Anwendung bei Erwachsenen.



Liebe Patientin, lieber Patient, lesen Sie bitte die gesamte Gebrauchsinformation sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

- Heben Sie die Gebrauchsinformation auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.
- Dieses Arzneimittel wurde Ihnen persönlich verschrieben und darf nicht an Dritte weitergegeben werden. Es kann anderen Menschen schaden, auch wenn diese dasselbe Krankheitsbild haben wie Sie.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Die Gebrauchsinformation beinhaltet:

1. Was ist Condylox und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Condylox beachten?
3. Wie ist Condylox anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Condylox aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. Was ist Condylox und wofür wird es angewendet?

Condylox ist eine antivirale Lösung zum Auftragen auf die Haut.

Condylox wird angewendet zur äußerlichen Behandlung von kleinen, umschriebenen, nicht entzündeten Feigwarzen (spitze Kondylome, Condylomata acuminata) im äußeren Genitalbereich.

Feigwarzen sind besondere Warzenformen, die im Genital- und Analbereich auftreten und durch Human-Papillomviren hervorgerufen werden.

2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Condylox beachten?**Condylox darf nicht angewendet werden,**

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Podophyllotoxin oder einen der sonstigen Bestandteile von Condylox sind
- bei entzündeten oder blutenden Feigwarzen
- bei gleichzeitiger Behandlung der Feigwarzen mit anderen Lokalthérapeutika
- bei Neigung zu Zeldysplasie (Morbus Bowen)
- bei Patienten mit Immunschwäche
- bei Neigung zu wiederholt auftretenden Herpesinfektionen im Genitalbereich
- bei positiver Lues (Syphilis)-Serologie
- bei Alkoholgenuß während der Therapie.

Anwendung bei Kindern und Jugendlichen

Condylox darf nicht bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren angewendet werden.

Bei Anwendung von Condylox zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken

Der Genuss von Alkohol während der Therapie mit Condylox kann zur massiven Verstärkung unerwünschter Wirkungen führen.

Daher sollte während der Behandlung mit Condylox auf Alkohol verzichtet werden.

Schwangerschaft und Stillzeit

Condylox darf nicht in der Schwangerschaft oder Stillzeit angewendet werden. Wenn Sie schwanger sind, vermuten schwanger zu sein, oder stillen, informieren Sie bitte umgehend Ihren Arzt.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise

Welche Vorsichtsmaßnahmen müssen beachtet werden?

Bei Frauen sollte vor der Anwendung von Condylox sichergestellt sein, dass keine Schwangerschaft vorliegt (im Zweifelsfall durch einen Schwangerschaftstest). Während der Behandlung mit Condylox muss bei Frauen im gebärfähigen Alter eine zuverlässige Schwangerschaftsverhütung durchgeführt werden.

Da Feigwarzen ansteckend sind, sollte sich der Sexualpartner/die Sexualpartnerin ebenfalls vom Arzt auf Feigwarzen untersuchen und gegebenenfalls behandeln lassen. Bis zur vollständigen Heilung sollte auf Geschlechtsverkehr verzichtet bzw. es sollten Kondome benutzt werden.

Condylox-Lösung darf nicht in die Augen gelangen! Falls das Präparat unbeabsichtigt in die Augen gelangt, sind diese gründlich mit Wasser zu spülen. Bei anhaltenden Augenbeschwerden sollte ein Augenarzt aufgesucht werden.

3. Wie ist Condylox anzuwenden?

Condylox ist eine Lösung zur Anwendung auf der Haut.

Wenden Sie Condylox immer genau nach Anweisung des Arztes an. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt nach, wenn Sie nicht ganz sicher sind.

Die Anwendung von Condylox sollte unter Anleitung des behandelnden Arztes erlernt werden. Je nach Lokalisation, Menge und Form der Feigwarzen entscheidet der Arzt, ob die Anwendung von Condylox vom Patienten bzw. von der Patientin selbst durchgeführt werden kann oder ggf. von medizinischem Fachpersonal oder von einer vertrauten Person vorgenommen werden sollte. Wenn Sie trotz Einweisung durch den Arzt Schwierigkeiten beim Auftragen der Lösung haben, sollte die Behandlung durch medizinisches Fachpersonal oder den Arzt weitergeführt werden.

Wie oft und in welcher Menge sollten Sie Condylox pro Tag anwenden?

Soweit nicht anders verordnet, wird Condylox 2 x täglich an 3 aufeinanderfolgenden Tagen auf maximal zehn Feigwarzen einer Größe von 1 bis 10 mm und insgesamt etwa 150 mm² (1,5 cm²) Fläche aufgetragen. Die einzelne Dosis soll nicht mehr als 0,25 ml betragen.

Wie sollten Sie Condylox anwenden?

Die betroffenen Stellen sollten vor der Anwendung gründlich mit Wasser und Seife gereinigt und anschließend abgetrocknet werden. Dann wird die Lösung mit einem der beigefügten Wattestäbchen möglichst punktgenau auf die Feigwarzen aufgetragen. Dabei ist es hilfreich, die vom Arzt bezeichneten und zu behandelnden Warzen direkt vor dem Auftragen der Lösung unter Sichtkontrolle unterstützend mit den Fingern zu ertasten. Beim Auftragen soll nur soviel Condylox benutzt



werden, wie notwendig ist, um die Feigwarzen zu bedecken. Die Lösung sollte nicht auf die umliegende Haut bzw. Schleimhaut gelangen. Condylox soll nicht im Vorhof der Scheide angewandt werden. Die behandelten Stellen müssen erst abtrocknen (etwa eine Minute), bevor sie mit anderen Hautbereichen oder der Kleidung in Kontakt kommen. Nach der Anwendung sollten die Hände gründlich gewaschen werden.

Wie lange sollten Sie Condylox anwenden?

Die 3-Tage-Therapie pro Woche mit Condylox kann wöchentlich bis zu einer Dauer von 4 Wochen wiederholt werden. Nach spätestens 4 Wochen sollten Sie Ihren Arzt aufsuchen, um den Erfolg der Behandlung kontrollieren zu lassen.

**Wenn Sie eine größere Menge Condylox angewendet haben als Sie sollten**

Falls Sie zuviel Lösung aufgetragen haben, tupfen Sie den Überschuss mit einem Papiertuch ab. Längerer Kontakt mit gesunder Haut ist zu vermeiden, da der Wirkstoff von Condylox die gesunde Haut reizen kann. Sollte es nach versehentlichem Auftragen zu großer Mengen zu stärkeren Hautreaktionen kommen (s. Abschnitt 4. Nebenwirkungen), brechen Sie die Behandlung ab und waschen Sie die betroffene Haut mit Wasser. Gehen Sie dann unverzüglich zum Arzt und nehmen Sie das Fläschchen Condylox und diese Gebrauchsinformation mit. Wenn Sie oder jemand anders versehentlich etwas Lösung verschluckt haben, suchen Sie bitte sofort den Arzt auf. Nehmen Sie auch in diesem Fall das Fläschchen Condylox und die Gebrauchsinformation mit.

Wenn Sie die Anwendung von Condylox vergessen haben

Wenn Sie eine Anwendung von Condylox vergessen haben, holen Sie die Anwendung möglichst bald nach. Lassen Sie die Anwendung entfallen, wenn sie zeitlich zu nah an die nächste anstehende Anwendung heranrücken würde.

Wenn Sie die Anwendung von Condylox abbrechen

Wenn Sie die Anwendung von Condylox abbrechen, sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann Condylox Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem Menschen auftreten müssen.

Bedeutsame Nebenwirkungen oder Zeichen, auf die Sie achten sollten, und Maßnahmen, wenn Sie betroffen sind:

Wenn Sie von einer der nachfolgend genannten Nebenwirkungen betroffen sind, wenden Sie Condylox nicht weiter an und suchen Sie Ihren Arzt möglichst umgehend auf.

Selten (1 bis 10 Behandelte von 10 000) kann durch Schwellung eine Vorhautverengung auftreten.

Andere mögliche Nebenwirkungen

Zu Beginn der Behandlung können Rötung, Stechen und eine mäßige lokale Reizung auftreten.

Gelegentlich (1 bis 10 Behandelte von 1 000) werden auch vorübergehende, oberflächliche Hautschäden und Entzündungsreaktionen beobachtet.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

5. Wie ist Condylox aufzubewahren?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton und der Flasche angegebenen Verfallsdatum nicht mehr verwenden. Das Verfallsdatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Nicht über 25 °C lagern. Glasflasche im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

6. Weitere Informationen**Was Condylox enthält:**

Der Wirkstoff ist Podophyllotoxin.

1 ml Lösung enthält 5 mg Podophyllotoxin [0,5%ige Lösung (m/V)].

Die sonstigen Bestandteile sind:

Ethanol 96%, Milchsäure, Natrium-(DL)-Lactat.

Wie Condylox aussieht und Inhalt der Packung:

Condylox ist eine klare, farblose Lösung.

Die Packung enthält eine Glasflasche mit 3,5 ml Condylox und spezielle Wattestäbchen zum Auftragen der Lösung auf die Haut im äußeren Genitalbereich.

Pharmazeutischer Unternehmer und Importeur

Einfuhr, Umpackung und Vertrieb:

kohlpharma GmbH, Im Holzau 8, 66663 Merzig

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im Oktober 2010