

## Fexofenaderm® 180 mg Filmtabletten

Fexofenadinhydrochlorid

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.
- Dieses Arzneimittel wurde Ihnen persönlich verschrieben. Geben Sie es nicht an Dritte weiter. Es kann anderen Menschen schaden, auch wenn diese dieselben Symptome haben wie Sie.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Fexofenaderm 180 mg und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Fexofenaderm 180 mg beachten?
3. Wie ist Fexofenaderm 180 mg einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Fexofenaderm 180 mg aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

### 1. WAS IST FEXOFENADERM 180 MG UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

Fexofenadinhydrochlorid, der Wirkstoff in Ihrem Medikament, gehört zu einer Gruppe von Arzneimitteln, die Antihistaminika genannt werden.

Fexofenaderm 180 mg ist für die Linderung von Symptomen wie Rötungen, Ödeme und Juckreiz, die in Verbindung mit allergischen Hautzuständen der so genannten chronischen idiopathischen Urtikaria (CIU) auftreten.

### 2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER EINNAHME VON FEXOFENADERM 180 MG BEACHTEN?

**Fexofenaderm 180 mg darf nicht eingenommen werden**

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Fexofenadinhydrochlorid oder einen der sonstigen Bestandteile von Fexofenaderm 180 mg sind.

Kinder unter 12 Jahren sollen dieses Medikament nicht einnehmen.

**Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Fexofenaderm 180 mg ist erforderlich**

- bei älteren Patienten.
- bei Nierenerkrankungen.

Sprechen Sie vor der Einnahme mit Ihrem Arzt.

**Bei Einnahme von Fexofenaderm 180 mg mit anderen Arzneimitteln**

Wenn Sie ein Mittel gegen Magenprobleme einnehmen, das Aluminium oder Magnesium enthält, sollten Sie zwischen der Einnahme dieses Arzneimittels und der Einnahme von Fexofenaderm 180 mg etwa 2 Stunden abwarten. Das Magenarzneimittel kann die Aufnahme des Wirkstoffs vermindern und die Wirkung von Fexofenaderm 180 mg beeinträchtigen.

Wenn Sie Fexofenadin zusammen mit Erythromycin oder Ketokonazol oder einer Einzeldosis eines Lopinavir/Ritonavir-Kombinationspräparats einnehmen, kann der Fexo-

fenadinspiegel im Blutplasma ansteigen. Eine Zunahme der Nebenwirkungen ist möglich.

**Allergietests:** Wenn Sie einen Allergietest machen, muss das Arzneimittel drei Tage vor dem Test abgesetzt werden.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen bzw. vor kurzem eingenommen haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

**Bei Einnahme von Fexofenaderm 180 mg zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken**  
Fexofenaderm 180 mg sollte mit Wasser eingenommen werden.

**Schwangerschaft und Stillzeit**

Fragen Sie vor der Einnahme von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Schwangerschaft

Nehmen Sie Fexofenaderm 180 mg während der Schwangerschaft nur ein, wenn Ihr Arzt dies für unbedingt erforderlich hält.

Stillzeit

Von der Einnahme von Fexofenaderm 180 mg während der Stillzeit wird abgeraten.

**Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen**

Es ist unwahrscheinlich, dass Fexofenaderm 180 mg Ihre Verkehrstüchtigkeit oder Ihre Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen beeinträchtigt. Es gibt allerdings immer seltene Ausnahmen, und Sie sollten sicherstellen, dass Sie vollkommen wach sind, ehe Sie sich an das Steuer eines Fahrzeugs setzen oder Arbeiten ausführen, die Ihre volle Aufmerksamkeit erfordern.

### 3. WIE IST FEXOFENADERM 180 MG EINZUNEHMEN?

Nehmen Sie Fexofenaderm 180 mg immer genau nach der Anweisung des Arztes ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

*Zur Linderung von chronisch idiopathischer Urtikaria (allergischen Hautzuständen):*

Die übliche Dosis für Erwachsene und Kinder ab 12 Jahren ist eine Filmtablette Fexofenaderm 180 mg täglich.

Nehmen Sie die Filmtablette mit Wasser ein.

Wenn Sie glauben, dass die Wirkung von Fexofenaderm 180 mg zu stark oder zu schwach ist, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

Wenn Sie eine größere Menge Fexofenaderm 180 mg eingenommen haben, als Sie sollten

Wenn Sie mehr Fexofenaderm 180 mg eingenommen haben als in dieser Gebrauchsinformation angegeben ist oder als Ihr Arzt Ihnen verordnet hat, wenden Sie sich an Ihren Arzt, die Notaufnahme oder Ihren Apotheker. Anzeichen für eine Überdosierung können Benommenheit, Schläfrigkeit, Müdigkeitsgefühl und Mundtrockenheit sein.

Wenn Sie die Einnahme von Fexofenaderm 180 mg vergessen haben

Wenn Sie eine Dosis vergessen haben, holen Sie die Einnahme so bald wie möglich nach, es sei denn, der Zeitpunkt für die nächste Einnahme ist nahe. Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

#### 4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann Fexofenaderm 180 mg Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen. Die folgenden häufigen, gelegentlichen und seltenen Nebenwirkungen sind bei Personen, die Fexofenadin eingenommen haben, aufgetreten.

**Häufig** (aufgetreten bei zwischen 1 von 10 und 1 von 100 Behandelten):

Kopfschmerzen, Schläfrigkeit, Übelkeit, Mundtrockenheit und Benommenheit.

**Gelegentlich** (aufgetreten bei zwischen 1 von 100 und 1 von 1.000 Behandelten):

Müdigkeitsgefühl, Schlafprobleme, Nervosität, Schlafstörungen und Alpträume.

**Selten** (aufgetreten bei zwischen 1 von 1.000 und 1 von 10.000 Behandelten):

Allergische Hautreaktionen wie Ekzem, Quaddeln und Juckreiz, unerwartete Schwellungen (Ödem), Engegefühl in der Brust, Kurzatmigkeit und Hautrötungen. Bei Symptomen einer anaphylaktischen Reaktion (z.B. Schwellungen oder Atemprobleme) oder bei schweren Hautreaktionen sofort ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

#### 5. WIE IST FEXOFENADERM 180 MG AUFZUBEWAHREN?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen Fexofenaderm 180 mg nach dem auf der Faltschachtel und der Blisterpackung angegebenen Verfalldatum nicht mehr einnehmen. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Für dieses Arzneimittel gelten keine besonderen Aufbewahrungsbedingungen.

Das Arzneimittel darf nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall entsorgt werden. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr benötigen. Diese Maßnahme hilft die Umwelt zu schützen.

#### 6. WEITERE INFORMATIONEN

Was Fexofenaderm 180 mg enthält

Der Wirkstoff ist Fexofenadinhydrochlorid.

Jede Filmtablette Fexofenaderm 180 mg enthält 180 mg Fexofenadinhydrochlorid, entsprechend 168 mg Fexofenadin.

Die sonstigen Bestandteile sind:

mikrokristalline Cellulose, Croscarmellose-Natrium, Maisstärke, Povidon K30 und Magnesiumstearat. Der Filmüberzug enthält Hypromellose, Titandioxid (E171), Macrogol 400, Macrogol 4000, Eisenoxid Eisen(III)-hydroxid-oxid x H<sub>2</sub>O (E172).

Wie Fexofenaderm 180 mg aussieht und Inhalt der Packung

Fexofenaderm 180 mg sind gelbfarbene längliche Filmtabletten, die auf der einen Seite glatt sind und auf der anderen Seite eine Bruchkerbe haben.

Fexofenaderm 180 mg wird in Packungsgrößen von 20, 50 oder 100 Filmtabletten angeboten.

Pharmazeutischer

Unternehmer

**Dermapharm AG**

Lil-Dagover-Ring 7

82031 Grünwald

Tel.: 089 / 641 86-0

Fax: 089 / 641 86-130

Hersteller

**mibe** GmbH Arzneimittel

Münchener Straße 15

06796 Brehna

(ein Tochterunternehmen  
der Dermapharm AG)

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt genehmigt im März 2011.

