

GEBRAUCHSINFORMATION

Hydrocortisonacetat-Suspension 0,5% mit Lidocainhydrochlorid und Dexpanthenol NRF 7.14

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient, ihr Arzt hat Ihnen ein Arzneimittel verordnet, das für Sie individuell hergestellt wurde. In dieser Gebrauchsinformation sind wichtige Informationen für Sie zusammengefasst. Lesen Sie die gesamte Gebrauchsinformation sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung des Arzneimittels beginnen. Heben Sie die Gebrauchsinformation auf, vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen. Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

1. Was ist das Arzneimittel und wofür wird das Arzneimittel angewendet?

Hydrocortisonacetat-Suspension 0,5% mit Lidocainhydrochlorid und Dexpanthenol ist eine entzündungshemmende und betäubende Mundspülung, die bei einer Schleimhautentzündung im Mund und Rachen angewandt wird.

2. Was müssen Sie vor Anwendung des Arzneimittels beachten?

Dieses Arzneimittel wurde für Sie persönlich verschrieben und hergestellt. Geben Sie es nicht an Dritte weiter. Es kann anderen Menschen schaden, auch wenn diese die gleichen Beschwerden haben wie Sie.

Das Arzneimittel DARF NICHT angewandt werden:

- Bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Hydrocortisonacetat, Lidocain, Dexpanthenol oder sonstigen Bestandteilen der Suspension

3. Wie ist das Arzneimittel anzuwenden?

Die Mundspülung ist vor jedem Gebrauch kräftig zu schütteln, bis kein Bodensatz mehr erkennbar ist und sich dieser gleichmäßig in der Flasche verteilt hat.

Zwei- bis dreimal täglich werden 15 ml Mundspülung in ein Glas Wasser (200 ml) gegeben und damit der Mund gespült. Danach wird sie wieder ausgespuckt.

Um eine längere Wirkung zu erreichen, sollte danach nichts nachgetrunken oder gegessen werden.

Aufgrund möglicher Nebenwirkungen soll eine lang andauernde, hoch dosierte Anwendung nur nach ärztlicher Verordnung erfolgen.

4. Welche Nebenwirkungen können möglich sein?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen. Abhängig von Ihrer persönlichen Empfindlichkeit und der aufgetragenen Menge sind folgende Nebenwirkungen für Hydrocortisonacetat-Suspension 0,5% bekannt:

- lokales Auftreten von Infektionen bzw. Wiederaufflammen von Infektionen auf der Mundschleimhaut
- allergische Reaktionen auf Lidocain
- Erregung oder Dämpfung des zentralen Nervensystems beim Verschlucken großer Mengen
- bei längerer hochdosierter Anwendung wird eine schwache Schädigung des Erbguts vermutet, daher sollte die langfristige Einnahme ärztlich überwacht werden.
- in Einzelfällen Kontaktallergie auf Dexpanthenol



Apotheke Johannstadt

Meldung von Nebenwirkungen: Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Ihre Ärztin oder an Ihre Apotheke. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Gebrauchsanweisung angegeben sind.

5. Was muss im Falle einer Überdosierung oder Vergiftung mit dem Arzneimittel getan werden?

Es ist in jedem Fall unverzüglich ein Arzt (z.B. Vergiftungsnotruf **0361730730**) um Rat zu fragen. Anzeichen einer leichten chronischen Vergiftung sind die o.g. Nebenwirkungen.

6. Wie ist das Arzneimittel aufzubewahren?

Bewahren Sie das Arzneimittel unzugänglich für Kinder auf.

Die Mundspülung ist bei Raumtemperatur, maximal 25°C, aufzubewahren.

Nach Anbruch ist die Suspension 6 Monate verwendbar, jedoch nicht länger als unter „verwendbar bis“ angegeben.

Fragen Sie in Ihrer Apotheke, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

7. Weitere Informationen

Die Wirkstoffe sind Hydrocortisonacetat, Lidocainhydrochlorid und Dexpanthenol.

1 g Suspension enthält 5 mg Hydrocortisonacetat, 10 mg Lidocainhydrochlorid und 50 mg Dexpanthenol.

Die sonstigen Bestandteile sind: Propylenglycol, Natriummonohydrogenphosphat-Dodecahydrat, Macrogol-40-glycerolhydroxystearat, Pfefferminzöl, gereinigtes Wasser.

Die Suspension ist mit Propylenglycol konserviert.

Dieses Arzneimittel ist verschreibungspflichtig.

8. Herstellende Apotheke

Apotheke Johannstadt
Willum Ullrich OHG

Pfotenhauerstr. 41, 01307 Dresden

Diese Gebrauchsinformation wurde das letzte Mal im Juli 2024 überarbeitet.