

GEBRAUCHSINFORMATION

Ölige Dronabinol-Tropfen 25 mg/ml

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient, ihr Arzt hat Ihnen ein Arzneimittel verordnet, das für Sie individuell hergestellt wurde. In dieser Gebrauchsinformation sind wichtige Informationen für Sie zusammengefasst. Lesen Sie die gesamte Gebrauchsinformation sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung des Arzneimittels beginnen. Heben Sie die Gebrauchsinformation auf, vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen. Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

1. Was ist das Arzneimittel und wofür wird das Arzneimittel angewendet?

Ölige Dronabinol-Tropfen 25 mg/ml ist eine Lösung zum Einnehmen zur Anwendung als Antiemetikum, Appetitstimulans, Muskelrelaxans und Analgetikum in besonders begründeten Fällen.

2. Was müssen Sie vor Anwendung des Arzneimittels beachten?

Dieses Arzneimittel wurde für Sie persönlich verschrieben und hergestellt. Geben Sie es nicht an Dritte weiter. Es kann anderen Menschen schaden, auch wenn diese die gleichen Beschwerden haben wie Sie.

Das Arzneimittel DARF NICHT angewandt werden:

- Bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Dronabinol oder den sonstigen Bestandteilen des Arzneimittels
- Während Schwangerschaft und Stillzeit

Bei koronarer Herzkrankheit und Angina pectoris sollte die Anwendung besonders überwacht werden.

3. Wie ist das Arzneimittel anzuwenden?

Ölige Dronabinol-Tropfen 25 mg/ml sollten vor der Mahlzeit eingenommen werden, z.B. auf ein Stück Brot oder Würfelzucker.

Die Lösung darf nicht mit Wasser verdünnt werden, es darf aber Wasser nachgetrunken werden.

Die Dosierung erfolgt individuell. Zur Appetitanregung wird zweimal täglich 2,5 mg Dronabinol gegeben. Dies entspricht 0,1 ml.

Bei Erbrechen in der Chemotherapie werden 5-20 mg, entsprechend 0,2 bis 0,8 ml, gegeben. Die erste Gabe erfolgt 1-3 Stunden vor Beginn der Chemotherapie und dann alle 2-4 Stunden, bis zu sechs Mal am Tag.

Zur Muskelentspannung und zur Schmerzlinderung bei Multipler Sklerose wird pro Tag 2,5 mg bis 10 mg, entsprechend 0,1 ml bis 0,6 ml, gegeben.

Eine inhalative Anwendung ist nicht möglich.

Die Dosierung erfolgt mit Hilfe der Dosierpumpe. Führen Sie vor erstmaligem Gebrauch einige Pumpvorgänge durch, bis der erste Tropfen austritt. Bei allen weiteren Anwendungen ist das Dosiersystem sofort gebrauchsfertig.

Bitte halten Sie die Flasche bei jeder Anwendung senkrecht mit der Dosiervorrichtung nach unten. **Die Lösung darf nicht in die Nase gegeben werden.**

Ein Hub entspricht 0,83 mg Dronabinol, drei Hübe entsprechen 2,5 mg Dronabinol.

4. Welche Nebenwirkungen können möglich sein?

Apotheke Johannstadt

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen. Abhängig von Ihrer persönlichen Empfindlichkeit und der aufgetragenen Menge sind folgende Nebenwirkungen für Dronabinol bekannt:

- Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall
- Schwindel, Euphorie, Nervosität, Benommenheit, Stimmungs- und Wahrnehmungsveränderungen
- schneller Herzschlag, Herzklopfen, orthostatische Hypotonie, Flush, allgemeine Schwäche

Es wurden keine Entzugserscheinungen beobachtet.

Als Folge der veränderten Wahrnehmung und Aufmerksamkeit bis zu 8 Stunden nach der Einnahme ist die Fahrtüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen stark eingeschränkt.

Warnhinweis: Nicht gemeinsam mit Alkohol weinnehmen! Die gleichzeitige Einnahme von Alkohol kann das Auftreten von Nebenwirkungen begünstigen und Nebenwirkungen verstärken.

Meldung von Nebenwirkungen: Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen die nicht in dieser Gebrauchsanweisung angegeben sind.

Meldung von Nebenwirkungen: Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Ihre Ärztin oder an Ihre Apotheke. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Gebrauchsanweisung angegeben sind.

5. Was muss im Falle einer Überdosierung oder Vergiftung mit dem Arzneimittel getan werden?

Es ist in jedem Fall unverzüglich ein Arzt (z.B. Vergiftungsnotruf **0361730730**) um Rat zu fragen. Anzeichen einer leichten Vergiftung können Mundtrockenheit, Kältegefühl, Schwindel, Übelkeit und ein beschleunigter Puls sein.

Nach einer leichten Vergiftung klingen die Symptome unbehandelt nach 3-6 Stunden wieder ab.

6. Wie ist das Arzneimittel aufzubewahren?

Bewahren Sie das Arzneimittel unzugänglich für Kinder auf.

Die Tropfen sind unter Lichtschutz und bei Raumtemperatur, maximal 25°C, aufzubewahren.

Nicht im Kühlschrank lagern!

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Etikett nach „Verwendbar bis“ angegebenen Verfallsdatum nicht mehr verwenden.

Fragen Sie in Ihrer Apotheke, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

7. Weitere Informationen

Der Wirkstoff ist Dronabinol (Δ^9 -Tetrahydrocannabinol).

1 ml enthält 25 mg Dronabinol.

Die sonstigen Bestandteile sind: Mittelkettige Triglyceride, Palmitoylascorbinsäure (E 304)

Dieses Arzneimittel ist verschreibungspflichtig.



Apotheke Johannstadt

8. Herstellende Apotheke

Apotheke Johannstadt
Willum Ullrich OHG
Pfortenhauerstr. 41, 01307 Dresden

Diese Gebrauchsinformation wurde das letzte Mal im Juli 2024 überarbeitet.