

GEBRAUCHSINFORMATION

Tetracyclin-HCl-Augentropfen 0,5%

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient, ihr Arzt hat Ihnen ein Arzneimittel verordnet, das für Sie individuell hergestellt wurde. In dieser Gebrauchsinformation sind wichtige Informationen für Sie zusammengefasst. Lesen Sie die gesamte Gebrauchsinformation sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung des Arzneimittels beginnen. Heben Sie die Gebrauchsinformation auf, vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen. Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

1. Was ist das Arzneimittel und wofür wird das Arzneimittel angewendet?

Tetracyclin-HCl-Augentropfen 0,5% sind antibiotische Tropfen zur Anwendung am Auge. Sie werden angewandt zur Behandlung von bakteriellen Infektionen am Auge, wie z.B. Bindehautentzündung, Entzündungen des Lidrandes oder der Hornhaut.

2. Was müssen Sie vor Anwendung des Arzneimittels beachten?

Dieses Arzneimittel wurde für Sie persönlich verschrieben und hergestellt. Geben Sie es nicht an Dritte weiter. Es kann anderen Menschen schaden, auch wenn diese die gleichen Beschwerden haben wie Sie.

Das Arzneimittel DARF NICHT angewandt werden:

- Bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Tetracyclin oder sonstigen Bestandteilen der Augentropfen
- Augentuberkulose und Pilzkrankungen am Auge
- Schwangerschaft & Stillzeit

3. Wie ist das Arzneimittel anzuwenden?

Die Zubereitung wird in den Bindehautsack eingebracht, indem das untere Augenlid vom Auge abgezogen wird.

Soweit nicht anders verordnet, 3-6 mal täglich.

4. Welche Nebenwirkungen können möglich sein?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen. Abhängig von Ihrer persönlichen Empfindlichkeit und der aufgetragenen Menge sind folgende Nebenwirkungen für Tetracyclin-AT 0,5% bekannt:

- Vorübergehendes Brennen und Augenirritationen
- Verschwommenes Sehen
- Hautausschlag unter UV-Licht

Meldung von Nebenwirkungen: Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Ihre Ärztin oder an Ihre Apotheke. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Gebrauchsanweisung angegeben sind.

5. Was muss im Falle einer Überdosierung oder Vergiftung mit dem Arzneimittel getan werden?



Apotheke Johannstadt

Es ist in jedem Fall unverzüglich ein Arzt (z.B. Vergiftungsnotruf **0361730730**) um Rat zu fragen. Anzeichen einer leichten chronischen Vergiftung sind die o.g. Nebenwirkungen.

6. Wie ist das Arzneimittel aufzubewahren?

Bewahren Sie das Arzneimittel unzugänglich für Kinder auf.

Tiefgekühlt bei -15°C lagern.

Nach dem Auftauen ist eine Flasche für 3 Tage bei Lagerung bei Raumtemperatur verwendbar, im Kühlschrank bei 2-8°C für 7 Tage, jedoch nicht länger als unter „verwendbar bis“ angegeben.

Fragen Sie in Ihrer Apotheke, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

7. Weitere Informationen

Der Wirkstoff ist Tetracyclin.

1 g Lösung enthält 5 mg Tetracyclin-HCl.

Die sonstigen Bestandteile sind: Natriumtetraborat, Natriumchlorid, Wasser für Injektionszwecke.

Dieses Arzneimittel ist verschreibungspflichtig.

8. Herstellende Apotheke

Apotheke Johannstadt

Willum Ullrich OHG

Pfotenhauerstr. 41, 01307 Dresden

Diese Gebrauchsinformation wurde das letzte Mal im August 2024 überarbeitet.