



## GEBRAUCHSINFORMATION

### **Clobetasol-Mundspülsuspension 0,05% mit Lidocain-HCl, Dexpanthenol und Kamille**

**Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient**, ihr Arzt hat Ihnen ein Arzneimittel verordnet, das für Sie individuell hergestellt wurde. In dieser Gebrauchsinformation sind wichtige Informationen für Sie zusammengefasst. Lesen Sie die gesamte Gebrauchsinformation sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung des Arzneimittels beginnen. Heben Sie die Gebrauchsinformation auf, vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen. Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

#### **1. Was ist das Arzneimittel und wofür wird das Arzneimittel angewendet?**

Clobetasol-Mundspülsuspension 0,05% ist eine entzündungshemmende und betäubende Mundspülung, die bei einer Schleimhautentzündung im Mund und Rachen angewandt wird.

#### **2. Was müssen Sie vor Anwendung des Arzneimittels beachten?**

Dieses Arzneimittel wurde für Sie persönlich verschrieben und hergestellt. Geben Sie es nicht an Dritte weiter. Es kann anderen Menschen schaden, auch wenn diese die gleichen Beschwerden haben wie Sie.

Das Arzneimittel DARF NICHT angewandt werden:

- Bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Clobetasol oder sonstigen Bestandteilen der Suspension

#### **3. Wie ist das Arzneimittel anzuwenden?**

Die Mundspülung ist vor jedem Gebrauch kräftig zu schütteln, bis kein Bodensatz mehr erkennbar ist und sich dieser gleichmäßig in der Flasche verteilt hat. Dosierung nach individueller ärztlicher Anwendung. Soweit nicht anders verordnet zwei- bis dreimal täglich 15 ml Mundspülung in ein Glas Wasser (200 ml) geben und damit der Mund spülen. Nach der Spülung Lösung wieder ausspucken. Um eine längere Wirkung zu erreichen, sollte danach nichts nachgetrunken oder gegessen werden.

#### **4. Welche Nebenwirkungen können möglich sein?**

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen. Abhängig von Ihrer persönlichen Empfindlichkeit und der aufgetragenen Menge sind folgende Nebenwirkungen für Clobetasol-Mundspülsuspension 0,05% bekannt:

- lokales Auftreten von Infektionen bzw. Wiederaufflammen von Infektionen auf der Mundschleimhaut
- allergische Reaktionen auf Lidocain
- Erregung oder Dämpfung des zentralen Nervensystems beim Verschlucken großer Mengen
- bei längerer hochdosierter Anwendung wird eine schwache Schädigung des Erbguts vermutet, daher sollte die langfristige Einnahme ärztlich überwacht werden
- in Einzelfällen Kontaktallergie auf Dexpanthenol



## Apotheke Johannstadt

*Meldung von Nebenwirkungen:* Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Ihre Ärztin oder an Ihre Apotheke. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Gebrauchsanweisung angegeben sind.

### **5. Was muss im Falle einer Überdosierung oder Vergiftung mit dem Arzneimittel getan werden?**

Es ist in jedem Fall unverzüglich ein Arzt (z.B. Vergiftungsnotruf **0361730730**) um Rat zu fragen. Anzeichen einer leichten chronischen Vergiftung sind die o.g. Nebenwirkungen.

### **6. Wie ist das Arzneimittel aufzubewahren?**

Bewahren Sie das Arzneimittel unzugänglich für Kinder auf.

Die Mundspülung ist bei Raumtemperatur, maximal 25°C, aufzubewahren.

Nicht länger verwenden als unter „verwendbar bis“ angegeben.

Fragen Sie in Ihrer Apotheke, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

### **7. Weitere Informationen**

Der Wirkstoff ist Clobetasol als Clobetasolpropionat.

1 g Zubereitung enthält 0,5 mg Clobetasolpropionat, 5 mg Lidocain-HCl-Monohydrat, 50 mg Dexpanthenol, 40 mg Kamillenfluidextrakt

Die sonstigen Bestandteile sind: Propylenglycol, Wasser für Injektionszwecke, Povidon

Dieses Arzneimittel ist verschreibungspflichtig.

### **8. Herstellende Apotheke**

Apotheke Johannstadt  
Willum Ullrich OHG

Pfotenhauerstr. 41, 01307 Dresden

Diese Gebrauchsinformation wurde das letzte Mal im August 2024 überarbeitet.